



BULLETIN D'ALERTE

MAUVAIS ETAT DES POPULATIONS HIVERNANTES DE BECASSES DES BOIS EN 2002-2003, EN FRANCE.

17 décembre 2002

La bécasse des bois est une espèce gibier très recherchée en Europe où l'effectif prélevé est estimé entre 4 et 5 millions d'individus chaque année. En France la dernière enquête sur les prélèvements réalisés en 1997-1998 situe l'espèce au 3ème rang des oiseaux migrateurs chassés avec 1 200 000 bécasses prélevées. Cette saison 2002-2003 est marquée de façon uniforme en France par une carence d'oiseaux jamais encore observée. La mortalité dans l'aire d'hivernage en 2001-2002 liée à une vague de froid, suivie d'une très mauvaise réussite de la reproduction dans l'aire de nidification en Europe du Nord et de l'Est, peuvent expliquer la faiblesse des effectifs actuels.

Les informations ont été recueillies à trois niveaux :

Au printemps-été 2002 dans l'aire principale de reproduction en Russie (conventions de recherches ONCFS-Organismes scientifiques russes n° 2002/90 et 2002/95).

A l'automne, lors de la migration en Russie centrale et en Russie du Nord-Ouest (conventions de recherches id.), mais également au Danemark (informations du National Environmental Research Institute) pour la période d'octobre à novembre.

En France via le Réseau bécasse lors des sorties baguage d'octobre à début décembre 2002.

La reproduction.

En Russie, les recensements des mâles à la croule ont mis en évidence une baisse de l'activité (nombre de contacts/heure) au printemps-été 2002 comparé aux trois années précédentes. Une baisse des effectifs était déjà sensible lors de la migration de printemps, ce qui suppose une plus forte mortalité au cours de l'hivernage 2001-2002.

A ce déficit d'adultes reproducteurs s'ajoute un faible succès de reproduction au cours du printemps 2002, en raison de mauvaises conditions climatiques. Une longue période très sèche et chaude de fin mai à fin septembre a sévi sur quasiment l'ensemble de la zone forestière de Russie Européenne. Cette sécheresse est connue pour être défavorable à l'élevage des nichées et réduit en conséquence la production de jeunes par femelle.

La migration.

Les observations sur la migration postnuptiale en Russie ont mis en évidence la faiblesse des effectifs et particulièrement des jeunes oiseaux. Ainsi l'âge-ratio en 2002 est-il égal à 2 (66% de juvéniles) pour la Russie centrale, la Russie du Nord et du Nord-Ouest alors qu'il fut toujours proche de 4 (80% de juvéniles) de 1994 à 2001. L'âge-ratio obtenu est donc particulièrement faible comparé à celui des années précédentes. Précisons qu'à notre sens, ce sont plus les écarts inter-annuels que les valeurs absolues des âge-ratios qui reflètent le niveau du succès de la reproduction. Au Danemark, au cours de l'automne 2002, l'âge-ratio ne s'élève qu'à 0,94 pour un échantillon de 434 oiseaux (48% de juvéniles). Cet âge-ratio est le plus faible enregistré depuis 16 ans. Il est comparable cependant à celui de l'année 1992 qui fut aussi une année difficile pour les populations de bécasses.

L'hivernage

En France, les données concernant 731 bécasses baguées dans 54 départements entre octobre et début décembre 2002 nous ont été communiquées. L'âge-ratio de cet échantillon oscille entre 0,93 et 1 (48 à 50% de juvéniles) alors que les années précédentes il s'élevait en moyenne à 1,5 (60% de juvéniles).

Conclusion et recommandations.

En résumé, l'ensemble des données récoltées tant en Russie, dans l'aire principale de reproduction, au Danemark, sur le parcours migratoire, et en France, dans l'aire d'hivernage, mettent en évidence un déficit en oiseaux lié probablement à un faible succès de reproduction succédant à une mortalité plus forte lors de l'hivernage 2001-2002.

Ces informations sont corroborées par une forte majorité de chasseurs dans les différentes régions de France. Les chasseurs spécialistes de cette espèce ne rencontrent pas les densités habituelles dans les territoires qu'ils parcourent depuis de nombreuses années. C'est en particulier le cas en Bretagne qui constitue la principale région d'hivernage pour la bécasse en France.

La plus grande prudence est donc recommandée aux responsables cynégétiques, garant de la gestion durable des espèces gibiers. Il nous paraît vivement souhaitable d'informer les chasseurs et de préconiser des mesures de gestion rapides pour janvier et février 2003.

Ainsi, toute mesure de réduction des prélèvements s'avère salutaire. Les prélèvements maximum autorisés (PMA), par exemple, pourraient être réduits dans les départements où ils sont appliqués et mis en place en urgence dans les autres départements, à l'initiative des structures cynégétiques.

Le Directeur des études et de la recherche
de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

Contacts :

Y. Ferrand : 01 30 46 60 16

F. Gossmann : 02 51 25 03 98